

A NYELŐCSŐ VARICOSITAS ÉS ELLÁTÁSA CENTRUMUNKBAN -AZ INTÉZMÉNYI ÉS HAZAI ADATOK ÖSSZEVETÉSE A NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ADATAI ALAPJÁN

Virág A.¹, Rényi T.¹, Horváth D.¹, Schafer E.¹, Rusznyák K.¹, Bakucz T.¹, Andrási P.¹, Varsányi M.¹, Gyökeres T.¹, Zsigmond F.¹, Herszényi L.¹, Szamosi T.¹

1. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Gasztroenterológia

A krónikus májbetegség szövődményeként kialakuló nyelőcső varicositas és az abból származó gasztrointestinalis vérzés jelentős mortalitással jár. A kórkép ellátására számos nemzetközi ajánlás rendelkezésre áll. Az ajánlásokban foglaltak betartását vizsgáltuk a kórházunkban 2017-ben megjelent akut és elektív betegek ellátása során, különös tekintettel az endoscopos beavatkozások (ligatio, scleroterápia), ballontamponád és vasoaktív szerek alkalmazása szempontjából. A vizsgálatba vont 182 oesophagus varicoitással rendelkező krónikus májbetegből (46 nő – 136 férfi) 32 esetben volt szükség akut ellátásra varix ruptura miatt. Felső panendoscopia során 19 esetben történt ligatio (8 akut – 11 elektív), 9 esetben sclerotherapy, 11 esetben ballontamponádra volt szükség. A májkárosodás etiológiája a bevont betegek zömében (154 eset) aethyles eredetű májcirrhosis volt, 28 esetben egyéb eredetű volt a portalis nyomásfokozódás. Előadásunkban a nemzetközi ajánlások tükrében elemezzük adatainkat és összevetjük a finanszírozó felé jelentett hazai adatokkal, keresve a ligatio alacsony arányának okát (a beavatkozások 15%-a).