

Ritka vaszkuláris szindrómák a gasztroenterológiában (esetismertetés)

Dr. Darvas Emília, dr. Szőnyi Mihány

Budai- és Pesti Gasztroenterológiai Centrum

Arteria mesenterica superior szindróma (Wilkie's szindróma)

Ok: az arteria mesenterica superior rendellenes eredése az aortából (<25 fok) Normál: 40-60 fok

Tünetei: hasi fájdalom, postprandiális hányás

Eredete: -kongenitális

-szerzett: hasi zsírszövet megkevesbedése

Esetismertetés: 17 éves nőbeteg.

Tünetek: hetek óta tartó postprandiális hányás, felhasi görcsös fájdalom. (acut gastroenteritist követően)

Vizsgálatok:

Labor: lényegében negatív többször ismételve

Natív hasi rtg, vékonybél passage: passage zavar nem mutatható ki.

Hasi ultrahang: nutcracker syndrome?

Gasztroszkópia: oesophagitissel járó reflux betegség

Neurológia, koponya CT: negatív.

Pszichológiai vizsgálat: szomatizáció?



Terápia: PPI, prokinetikum, tápszer, folyékony-pépes étrend.

Vékonybél CT: -mesenterialis és retroperitoneális zsírszövet jelentős megkevesbedése

-az aorto-mesentericus szög 19 fok

-aorta abdominalis-AMS távolság: 6 mm.

Dg: AMS-szindróma



DD: Nutcracker syndrome: bal vena renalis leszorítása az AA és AMS között-microscopos haematuria

Kezelés: -tápláltsági állapot javítása, hasi zsírszövet visszanovelése

-duodenum sebészi felszabadítása