


DEMENCIÁVAL TÁRSULÓ VASCULARIS ENCEPHALOPATHIÁBAN ÉSZLELT HIRTELEN KOGNITÍV HANYATLÁS. MI ÁLLHAT A HÁTTÉRBE? ESETISMERTETÉS.

Farkas Zs.1, Takács E.1, Ihionvien K.2, Taller A.1

(1) II. Belgyógyászat, Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, (2) Neurológia, Budapesti Uzsoki Utcai Kórház

Bevezetés

Vascularis dementia rapid romlását okozhatja friss agyi infarktus, autoimmun folyamat vagy fertőzés. A Herpes simplex vírus 1-es típusa (HSV-1) az életkor előrehaladtával egyre nagyobb átfertőzöttséggel jár. Egy primer bőr- vagy nyálkahártya fertőzést követően retrográd axonális transzport révén évtizedekig megbújhat a ganglionokban. Később egy trigger mechanizmust követően mind a perifériát, mind a központi idegrendszert képes elérni.



Esetismertetés


Anamnézis: 71 éves nő

- T2DM, multilocularis érbeteg
- Demencia (koponya MR: kr. vascularis laesiok és atrophia)

Felvétel oka: rapid kognitív hanyatlás, alhasi fájdalom, egyszeri láz és hypoglycaemia

Vizsgálatok:

- Labor (CRP 33)
- Natív koponya és mellkas-has-kismedence CT



Következtetés

Szubtilis klinikum esetén a korrektül elvégzett vizsgálatok segítenek a diagnózis felállításában. Mivel a HSV-1 döntően neuronokban szaporodik, nem okoz nagy citokin felszabadulást, így a vírus okozta encephalitis nem feltétlen jár magas gyulladásos paraméterekkel és a tünetek is lehetnek szegényesek. Demens betegnél észlelt rapid kognitív hanyatlás hátterében gondolnunk kell a HSV-1 okozta encephalitis lehetőségére is.