

AZ INFEKTOLÓGIA EZER ARCA

Németh Nóra Rita¹, Szatmári Z.¹, Elekes Z.¹, Takács E.¹, Taller A.¹
1 II. Belgyógyászat, Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, Budapest

Bevezetés

A Crohn-betegségre emlékeztető klinikai és endoszkópos eltérések háttérében nem minden esetben krónikus gyulladásos bélbetegség igazolható. Infektív eredetű kórképek hasonló morfológiai képet mutathatnak, jelentős differenciáldiagnosztikai nehézségeket okozva.

Esetismertetés

29 éves férfi lymphadenomegaliával

Láz, fogyás, hasifájdalom
Pericardialis folyadék
Felsőlebenyi infiltrátum
Hepatosplenomegalia
Ascites,
Bélfalmegvastagodás

Crohn

Infekció

Szisztémás
alapbetegség

Hepatitis

Endocarditis,
pericarditis

Szifilisz

TBC, bél-TBC

Malária

HIV-AIDS

Májcirrózis

Lymphoma

Sarcoidosis

SLE

Colonoscopya

MR engerográfia

Vírus szerológia

Echocardiographia

Pericardiocentesis?

Vizsgálati eredmények

- HIV-AIDS
- BAL: Mycobacterium tuberculosis komplex
- BAL: P. aeruginosa
- CMV viraemia
- Haemokultura és liquor vizsgálat: E. faecium
- C. difficile colitis
- Terminális ileum biopszia:
 - granulomatosus gyulladás a terminális ileumban
 - TBC immunhisztokémia - nagy mennyiségű saválló pálca

Terápia

- *Dolutegravir+emtricitabine+tenofovir*
- *Vancomycin per os*
- *Gancyclovir*
- *Ampicillin/Ceftriaxon*
- *Ceftolozan/Tazobaktam*
- *TMP/SMX*
- *Rifabutin+isoniazid+ethambutol+pyrazinamid*

2023.07. Tüdőgondozó - jobb csúcsi góccárnyék miatt
kiemelve, Quantiferon neg, kontrollon nem jelent meg

Következtetés

A Mycobaktérium fertőzés, különösen a bél TBC gyakran emlékeztethet Crohn betegségre, így differenciáldiagnosztikai kihívást jelenthet. A HIV és TBC koinfekció gyakori, így bármelyik diagnózis esetén fontos a másik fertőzést is célozatosan vizsgálni.

